外臺秘要方卷第二十五 痢三十三門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

水穀痢方一十首

水痢方六首

久水痢不差腸垢方四首

冷痢方二十二首

冷痢食不消下方六首

白痢方八首

重下方六首

卒暴冷下部疼悶方二首

冷熱痢方七首

熱毒痢方三首

熱毒血痢方六首

靜嘉堂文庫所藏

赤痢方四首
久赤痢方二首
卒下血方七首
血痢方六首
久血痢方三首
蠱注痢方三首
腸蠱痢方一首
膿血痢方七首
赤白痢方六首
久赤白痢方四首
疳痢方六首
久疳痢及久痢成疳方九首
數十年痢方一十一首

休息痢方五首
腹肚不調痢方一首
洩痢不禁不斷及日數十行方三首
下焦虛寒及遠血近血方二首
下痢食完出及上入下出方二首
下痢腸滑方三首
大注痢及赤白困篤腸滑方二首
痢兼渴方二首
許仁則痢方七首
水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其

靜嘉堂文庫所藏

傒身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化爲榮衛以養藏腑充實肌膚大腸肺之腑也爲傳道之官化物出焉水穀之精化爲血氣者行於經脉其糟粕行於大腸也肺與大腸爲表裏而肺主氣其傒身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則爲風邪所傷客至肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能尅制水穀故糟粕不結聚而變爲痢也又新食竟取風名爲胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大失衣則䐜滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絶即死診其脉小手足寒難療也脉大手足温易療也下白沫脉沉則生浮則死身不熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以藏期之也脉絶而手足寒晬時脉還手足温者生脉不還者死脉緩時小結者生洪大數者死懸絶而濇者死細微而濇者生緊大而滑者死得大絶脉者不死養生方云秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早卧早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應也收養之道也逆之則傷肺冬爲飱泄又云五月勿食未成核果及桃李發癰節不爾發寒熱變黃疸又爲泄痢出第十七卷中

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆六分　白朮五分　赤石脂七分研　厚朴六分炙

乾薑六分　熟艾四分　龍骨七分　甘草四分炙

黃連十分　烏梅六分熬　人參六分　當歸五分

右十二味擣篩爲末蜜丸以米飲汁服二十丸如梧子大日三服加至三十丸出第四卷中忌海藻菘菜猪肉生冷等

集驗論黃帝問曰人若溏泄下痢者何也對曰春傷於風夏生溏泄腸澼久風亦爲溏泄也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連　阿膠各二兩炙　梔子三十枚擘　烏梅二十枚碎

黃蘗一兩

右五味切以水七升煮取二升半分爲再服神良備急同忌猪肉冷水肘後名烏梅湯療熱下䘌

又方

黃連一升金色者打碎　陳米五合

右二味以水七升煮取二升分再服肘後文仲同忌猪肉冷水並出第四卷中

刪繁療中膲熱水穀下痢藍青丸方

藍青汁三升　黃連八兩　黃蘗四兩　阿膠五兩炙

白术　地榆　地膚子　烏梅肉各三兩熬　一

右八味擣篩爲散用藍汁和微火上煎煎取可爲丸丸如杏子清旨飲進三丸亦不得停留忌猪肉冷水桃李雀肉等出第四卷中

崔氏療水穀痢方

乾薑三分　雞子二枚　小豆二百粒炒令香中食　黃連三分

右四味擣篩三物內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十丸如小豆大旦以飲服差即停忌食脂膩生冷猪魚蒜葱出第三卷中

文仲療用仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一寫五六升水方

黃連去毛　厚朴各三兩

右二味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉冷水出第三卷中

必効療水穀痢方

小豆一升煮　臘二兩煮

右二味和頓服之即愈

又方

樓藺皮燒灰

右一味研以水和服三方寸匕並出第二卷中

靜嘉堂文庫所藏

古今録驗療熱水穀下痢方

黄連 阿膠各二 梔子二十枚

右三味切以水七升煑取二升分爲三服忌猪肉冷水

又方

黄連 當歸 甘草炙各二兩 酸石榴皮三兩

右四味切以水三升煑取一升半分爲三服忌海藻菘菜猪肉冷水並出第十卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白濃日夜無節度但疑是冷悉主之方

白石脂 乾薑各八分

右二味擣篩爲末以沸湯和少許麪薄糊和藥併手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓八分 白龍骨八分研 訶梨勒皮八分

黄連八分 酸石榴皮八分

右五味擣篩爲末蜜丸空心以飲服如梧子大三十丸日二服差止忌猪肉油膩生冷等出第四卷中

文仲療水痢百起者馬藺散方

馬藺子 乾薑 黄連元無分兩

右三味爲散熟煑湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水

又方

朽骨灰牛骨灰亦得 麴六月六日造熬令黄

右二味等分爲散空腹飲服一方寸匕無六月六日麴時用常麴亦得御傳並出第三卷中

靜嘉堂文庫所藏

經心録主水痢方

雞子二枚　黄蠟一兩

右二味熬熟合之宜空腹食之日三服佳

又方

黄連　倉米各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煑赤豆作漿粥服

三十九日三服若渴但飲豆漿粥並出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虚滑所以因

下痢而便腸垢也出第十七卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方

烏梅二十枚碎

右一味以水二升煑取一升頓服之

又方

石榴一枚

右一味合皮擣絞取汁隨多少服之最良

備急療水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂　桂心　乾薑　附子炮

右四味等分擣篩蜜丸如小豆每服三丸日三服飲下忌猪

肉冷水生葱肘後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黄連二兩　黄蘗二兩　阿膠二兩炙

右三味擣篩爲散以苦酒蜜各半升煎内阿膠令烊又内諸

藥令可丸飲服三丸日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虚弱受於寒氣腸虚則泄故爲冷痢也凡

靜嘉堂文庫所藏

痢色青色白色黑皆爲冷也色黃色赤並是熱也故痢色白食不消謂之寒中也診其脉沈則生浮則死出第十七卷中

廣濟療冷痢青白色腹内常鳴其痢行數甚疎出太多此是冷痢宜服調中散方

龍骨　人參　黃連　阿膠（炙）

黃蘗（各一兩）

右五味擣篩爲散煑米飲服兩方寸匕日再服差停忌猪魚冷水蒜炙肉粘食出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者爲寒下方

黃連　乾薑（各三兩）

右二味擣篩白酒一升半合煎令可丸飲服如梧子大二十丸欲多作依此法也忌猪肉冷水

又方

黃連（二兩）　甘草（半兩炙）　附子（半兩炮）　阿膠（半兩炙）

右四味切以水三升煑取一升半分再服之忌猪肉冷水海藻菘菜

又方

半夏（洗）　烏頭（炮）　甘草（炙各等分）

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日再服忌猪羊肉海藻菘菜餳等

又方

生薑汁（二升）　白蜜（一升半）

右二味相和分再服之已

又方

臘（白二兩）　乾薑（三兩末）

右二味以水六升半升著米一合煑作糜糜熟内薑一食

靜嘉堂文庫所藏

冷盡不差更作備急同

又方

酸石榴皮炙燥

右一味爲末服方寸匕文仲同

又方

乾薑二兩末　雜麪一升

右二味爲燒餅熟食之盡更作不過三劑差文仲同

又療絶下白如鼻涕者方

龍骨　乾薑　附子炮

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子飲下五丸漸至十丸日一服忌猪肉冷水文仲同

又方

黃連末　臘　阿膠各一兩

右三味先以酒半升令沸下膠臘令烊乃内黃連末頓服之忌猪肉冷水本云姚氏療辛注下并痢血一日夕數十行

又方

灸臍下一寸五十壯良文仲同並出第二卷中

千金論曰凡五藏絶於内者下不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一下病體例略如此耳素問曰春傷於風夏爲膿血夏多滞下也夏傷於風秋必洞泄秋下水者患必是冷也

又療久冷痢下純白者此由積卧冷處經久病發遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡白痢屬冷赤痢屬熱方

上好麴末五升微熬令香

右一味温清淳酒令熱和麴末一升空腹一頓服之日三若至食時擣蒜一升令至熟下薑椒末調如常食法唯須稠勿加鹽以水和麪二升作索餅極熟爛煮之乾漉熱内蒜甕中

靜嘉堂文庫所藏

相和一頓食之少與餘食至飢時仍進前食麴末酒比至差
來少食餘食以此法療不過兩日必差
又烏梅丸療冷痢久下方
烏梅（三百粒） 當歸（四兩） 乾薑（十兩） 桂心（六兩）
附子（六兩炮） 黃連（十六兩） 蜀椒（四兩汗） 細辛（六兩）
人參（六兩） 黃蘗（六兩）
右十味異擣篩合治之苦酒漬烏梅一宿去核蒸之如五斗
米下擣如泥盤中揉令相得蜜和擣二千杵食前飲服如梧
子十丸日三稍增至二十丸忌生冷猪肉冷水生葱生菜（此本仲景傷寒論方）
又舊療痢於貴勝用建脾丸多効今療積久冷痢先以溫脾湯
下訖後以建脾丸補之未有不効者貧家難以克辦亦不可將
息溫脾湯方療積久冷痢赤白者
大黃（三兩） 桂心（三兩） 附子（炮） 乾薑

人參（各二兩）
右五味切以水七升煑取二升半分爲三服日再忌猪肉冷水
生葱並出第十五卷中
備急葛氏療痢色白食不消者爲寒下方
豉（一升綿裹） 薤白（一把）
右二味以水三升煑取二升及熱頓服之陶効方云療暴下
大去血痢姚療赤白下痢並効肘後同
又方
牛角䚡（燒灰）
右一味擣篩白飲服方寸匕日三肘後同
又方
好麴（炒）
右一味擣篩煑米粥內麴方寸匕日四五云此療日百行師

靜嘉堂文庫所藏

不救者肘後同並出第六卷中

古今録驗白頭翁湯療寒急下及滯下方

白頭翁 乾薑各二兩 甘草一兩炙 當歸一兩

黃連 秦皮各一兩半 石榴皮一兩生者二兩

右七味切以水八升煮取三升分爲四服忌海藻菘菜猪肉冷水出第十卷中

近効療冷痢方

肉豆蔻五顆合皮碎 甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升半頓服之户部李尚書處得云療冷痢極者有効自用得力

又療久冷痢方

赤石脂擣作末和麪作餺飥空腹服一椀以下不過兩頓差老人尤佳體中先熱者不可服之以上三方新附

文仲治青下白下薑附散方

乾薑 附子炮 皂莢炙去子

右三味等分擣篩爲散飲服方寸匕不過再服即愈亦可丸服小品肘後同

又治冷痢薑艾餛飩子方

乾薑末 熟艾

右二味等分作麪餛飩如酸棗大煮熟服四五十枚日二服腹脹者炙厚朴煮汁服藥此熱服訖即須食飯大效曾有産婦冷痢加白膏服之立差腹痛亦定

冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五内中冷及微下痢方

白朮八兩 神麴末五兩熬令香 甘草炙 乾薑

枳實炙各二兩

靜嘉堂文庫所藏

右五味擣篩蜜和丸空腹以温酒服如梧子二十丸日二服漸
加至三十丸腹中痛者加當歸忌熱麪海藻菘菜桃李雀肉等
出第四卷中
文仲華他治老小下痢柴立不能食食不化入口即出命在旦
夕久痢神驗方
黃連末半雞子殼許　亂髮灰準上　醇苦酒準上
蜜準上　白臘方寸匕　雞子黃一枚
右六味於銅器中炭火上先内苦酒蜜臘雞子黃攪調乃内
黃連末髮灰又攪煎視可摶出為丸久困者一日一夜盡之
可可者二日盡之肘後同出第三卷中
延年增損黃連丸主腹内冷食不消及冷痢兼補方
黃連　黃耆各三分　龍骨三分　當歸
甘草炙五分　乾薑　厚朴炙各六分　地榆

白朮　人參各一分
右十味擣篩蜜丸如梧子飲酒任下服十五丸日再服加至
二十丸忌猪肉冷水桃李雀肉生葱海藻菘菜蔣孝璋處
又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方
地榆炙六兩　赤石脂七分　厚朴炙六分　白朮五分
乾薑六兩　龍骨七分　黃連十分　當歸五分
熟艾五分　烏梅肉熬六分　甘草炙四分
右十一味擣篩蜜和丸如梧子以飲服二十丸日二服加至二
十五丸忌猪肉冷水海藻菘菜生冷油膩桃李雀肉等並
出第七卷中
吳爽師療冷痢下膿血絞臍痛食不消腹脹方
吳茱萸　乾薑各六分　赤石脂　麴末熬各八分
厚朴炙　當歸各四分

靜嘉堂文庫所藏

右六味擣篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十丸日再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方

吴茱萸　人參　芎藭　桔梗

甘草炙各四分　枳實炙三枚　乾薑十二分　附子炮八分

麴末二十分熬

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲下七丸日二服漸加之

文仲云温脾丸療久寒氣逆腹滿面目瘦黄食不消化

白痢方八首

病源白滯痢者腸虚而冷氣客之薄於腸間津液凝滯成白故

爲白滯痢出第十七卷中

廣濟療白膿痢方

甘草六分炙　厚朴十二分炙　乾薑　枳實炙

茯苓各八分

右五味切以水五升煑取一升六合絞去滓分爲二服日再

忌生冷油膩小豆粘食海藻菘菜醋物等

又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴五兩炙　豆蔻五枚　甘草一兩炙　乾薑一兩

右四味切以水五升煑取一升五合絞去滓分爲二服日再

忌生冷油膩海藻菘菜並出第四卷中

千金大桃花湯主冷白滯痢腸痛方

赤石脂八兩　乾薑　當歸　龍骨各三兩

附子炮　牡蠣各二兩熬　芍藥　甘草炙各一兩

人參一兩半　白朮一升

右十味切以水一斗二升煑白朮取九升内藥煑取三升分

爲三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮二兩忌桃李雀肉海

藻菘菜猪肉冷水等

靜嘉堂文庫所藏

又方

龍骨六兩　厚朴三兩炙　赤石脂五兩　當歸一兩

右四味切以水七升煮取二升半分爲三服日再服熱加白頭翁十分牡蠣三兩

延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

烏梅肉熬　熟艾　黃蘗　甘草炙各八分

右四味擣篩蜜丸如梧子以飲服十五九日三服忌海藻菘菜出第七卷中

必効白痢方

麻子汁

右一味以汁煮取菉豆空腹飽服極効

又方

黃連末

右一味以水和每服三匕即愈並出第二卷中

古今錄驗療白滯下晝夜無復數龍骨湯方

龍骨　牡蠣各三兩熬　烏梅肉　熟艾

白頭翁　乾薑各一兩　女萎　黃連

當歸各二兩　甘草六兩炙

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一斷便止忌海藻菘菜猪肉冷水出第十卷中

重下方六首

病源此謂今赤白滯下也令人下部疼重故名重下去膿血如雞子白日夜數十行繞臍痛也出第十七卷中

肘後療重下方

黃連一升切

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服臍當小絞痛則差

靜嘉堂文庫所藏

又方

鼠尾草

右一味以濃煑煎如薄飴糖服五合至一升日三赤下用赤花者白下用白花者佳也文仲備急同

文仲隱居効驗方主下部絞痛重下下赤白方

當歸　黃蘗　黃連　乾薑各二兩

右四味擣篩煑取烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑大効神良祕之備急同忌猪肉出第三卷中

備急療重下方此即赤白痢下也令人下部疼重故名重下葛氏方

豉熬令少焦

右一味擣服一合日再三服無比又熬豉令焦水一升淋取汁服冷則用酒淋日三服之肘後文仲同出第六卷中

古今録驗重下下赤者方

取獺赤糞下白取白糞燒末

右一味以飲清旦空腹服一小杯三旦飲之即愈

又療得毒病後得重下赤白絞痛方

石鍾乳一兩研　黃連　防風　附子炮

黃蘗　蜀椒汗　當歸　乾薑各二兩

右八味切以水六升煑取二升半分三服適寒温服忌猪肉冷水並出第十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金療卒暴冷下部疼悶方

燒塼令熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方

黍米二升　臘　羊脂　膠炙各二兩

靜嘉堂文庫所藏

右四味合煑作粥一頓令盡即差並出第十五卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱利者由腸胃虛弱宿有寒而為客熱所傷冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間則變為血痢也而冷伏腸內搏津液則變凝白則成白滯亦變赤白痢也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云泄下有寒者微一作引氣以息內腹徐吹息以鼻引氣氣足復前即愈其有熱者微呼以去之也出第十七卷中

刪繁療下膲冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方

香豉一升熬綿裹　白朮六兩　薤白一升切　升麻二兩

右四味切以水七升煑取二升半分為三服忌桃李雀肉等出第四卷中

古今錄驗生春石榴漿療冷熱不調下或滯或水或赤白青黃者方

酸石榴五枚

右一味合殼舂絞取二升汁分服五合稍稍服二升盡即斷小見以意服二三合佳千金同出第十卷中

吴爽師無問冷熱新舊痢方

黃連　黃蘗　乾薑　甘草炙

艾三月三日者熟　烏梅肉熬各八分　附子三枚　臘一雞子大

右八味擣篩以蜜和臘於鐺中鎔之其著蜜須候臘鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十丸日二漸加至五六十丸忌海藻菘菜豬肉冷水

近効療痢無問冷熱神驗黃連丸方

黃連一兩大　茯苓二兩小　阿膠一兩小炙

右三味先擣黃連茯苓為末以少許水鎔阿膠和為丸仍眾手丸之暴乾量患輕重空腹以飲下三四卅丸漸漸加至六十丸

靜嘉堂文庫所藏

不過五六服必差常用之極効

又療若下無問冷熱及膿血痢悉主之方

生犀角屑　黃蘗各二兩　黃連　苦參各三兩

右四味擣篩爲散以糯米煑作飲莫令生每日空腹服一方寸匕日再服便差勿輕之此方於度支王郎中處得曾用極効肘後有當歸云庚侍郎家方產後彌佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并疳溫劉秘監積年患痢每服此即愈方

阿膠二兩一兩炙入藥一兩餔作清　吳黃連一兩　乾薑二兩

入黃無食子二枚久痢腸滑甚者量加至三四枚

右四味擣篩爲末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸日再漸加至三十丸老小者以意斟酌禁如常法出第三卷中一云若冷痢以酒下熱痢以粥飲下

文仲治無問冷熱及五色痢入口即定方

黃連四分　黃蘗　當歸　黃芩各二兩

阿膠二兩炙　熟艾一兩

右六味擣篩爲散以醶醋二外煑膠烊下藥煑令可丸如大豆飲服七八十丸日二夜一服特宜老人若產婦痢加蒲黃一兩蜜和爲丸大神驗効出第三卷中

熱毒痢方三首

肘後若下色黃者協毒熱下也療之方

梔子十四枚去皮

右一味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日再服出第二卷中

千金療熱毒痢方

若參　橘皮　獨活　阿膠炙

藍青　黃連　鬼箭羽一云鬼臼　黃蘗

靜嘉堂文庫所藏

甘草炙

右九味等分擣篩以蜜烊膠和併手丸如梧子乾以飲服十丸日三稍加之卒下莊痢者大良忌猪肉冷水海藻菘菜出第十五卷中

文仲治熱痢久不差者黃連丸方

黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十丸至二十丸日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛此是熱痢宜生犀角散方

生犀角末 酸石榴皮熬 枳實熬令黃各三兩

右三味各異擣篩為散以飲服兩方寸匕日再差停忌熱食物

又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻 地榆 蒨根 黃芩各六分

犀角四分 生地黃八分 梔子七枚擘 薤白八分

香豉二合綿裹

右九味切以水六升煮取一升五合絞去滓分溫三服日再忌諸熱物並出第四卷中

千金大熱毒純血痢療不可差者方

黃連六兩

右一味切以水七升煮取二升半夜露著星月下旦空腹頓服之卧將息不差加黃連二兩更作服之仍不差者以痢法療之佳忌如常法

又療熱毒下黑血五內攪切痛日夜百行氣絕欲死方

黃連一升 龍骨 白朮各二兩 阿膠炙

乾薑 當歸 赤石脂各三兩 附子一兩炮

右八味切以水一斗煮取五升分為五服余以正觀三年七月

靜嘉堂文庫所藏

十二日忽得此痢至于五日將絶處此方藥入口即定忌猪肉
冷水桃李雀肉並出第十五卷中
古今錄驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方
犀角屑　人參　當歸各三兩　黃連四兩
蜜一合
右五味切以水五升煑取一升去滓內蜜煎三沸分爲三服
日三忌猪肉冷水出第十卷中
文仲治熱毒痢瘌血犀角散方
生犀三兩　石榴皮燒三兩　黃連三兩　乾藍二兩
地榆三兩
右五味擣篩爲散以米飲服三方寸匕日二服出第三卷中
赤痢方四首
病源此由腸胃虛弱爲風邪所傷則成痢挾熱熱乘於血則血
流滲入腸與痢相雜下故爲赤痢也出第十七卷中
集驗療下赤痢方
秫米一把　鯽魚鮓二臠細切　薤白一虎口細切
右三味以合煑如作粥法啜之古今錄驗同出第四卷中
千金療赤滯下方
成煎猪膏三合　清酒五合
右二味以緩火煎十沸適寒溫頓服之取差止
又論曰凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹
食所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽此將息之大經也
若將息失所聖人不救也並出第十五卷中
必效療赤痢方
香淡豉半升大　黃連一兩大
右二味以水一升半浸豉一日濾取汁碎黃連薄綿裹豉汁

靜嘉堂文庫所藏

中煎取強半升空腹頓服即上桑泉蔣尉云劾出第二卷中

崔氏治赤痢黄連丸方

陳倉米四分 黄連四分 乾薑四分

右三味擣篩爲末縷火炒令色變以內二顆雞子白中熟和丸如梧子大空腹服五十丸以好無灰酒温一盞下之至晚間痢赤色當變白明旦即差更服如前出第三卷中

久赤痢方二首

病源久赤痢者由體虚熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虚不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變爲嘔噦也胃虚穀氣衰蟲動侵食則變爲䘌也出第十七卷中

千金療下赤連年方

地榆 鼠尾草各一兩

右二味切以水二升煮取一升分爲二服如不差取屋塵水漬去滓服一升日二服古今録驗服屋塵汁一小盃餘同此是徐平方療下血二十年者若不止重服即愈肘後同

又方

鼠尾草 薔薇根 秦皮用槲皮亦得

右三味等分水漬煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五六丸日三稍增差止亦可濃汁服半升出第十五卷中

卒下血方七首

深師治卒下血晝夜七八行方

黄連 黄蘗各四兩

右二味切以淳苦酒五升煮取一升半分爲二服亦療下痢忌猪肉冷水

又療卒下血蒲黄散方

蒲黄三合 當歸一兩 鹿茸一枚

靜嘉堂文庫所藏

右三味擣篩爲散飲服方寸匕先食日三並出第二十六卷中

集驗療卒下血不止方

草龍膽滿一虎口

右一味切以水五升煑取二升半分爲五服如不差更服出第四卷中

葛氏療卒下血方

小豆二升

右一味擣碎水三升和絞取汁飲之姚云立止

又方

黃連半兩　黃蘗二兩　梔子二七枚擘

右三味切以酒二升漬一宿去滓煑三沸頓服之忌猪肉冷水並出第十六卷中

崔氏治卒下血不止方

竈突中塵一升　黃連五兩　地榆三兩

右三味擣篩爲散粥飲服方寸匕日再服重者夜一

近効治卒下血不問丈夫婦人立効牛角䚡灰散方

黃牛角䚡一具燒赤色出火即青擣

右一味爲細散食前濃煑豉汁和二錢匕重者日三神驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒折於血血滲入大腸故也血之隨氣循環經絡通行藏腑常無停積毒熱氣乘之遇腸虛者血滲入於腸腸虛則洩故爲血痢也身熱者死身寒者生診其關上脉芤大便去血暴下血數升也出第十七卷中

廣濟療血痢黃連丸方

黃連　白龍骨炙　禹餘粮　伏龍肝各八分

代赭研　乾薑各六分

靜嘉堂文庫所藏

右六味擣篩蜜和丸飲服三十丸如梧子漸加至四十丸差止忌
猪肉冷水熱食
又療痢鮮血方
蒨根 黃連 地榆各八分 梔子十四枚
薤白切 香豉各八合 犀角六分屑
右七味切以水八升煮取二升分爲三服日再忌猪肉冷水
並出第四卷中
必効療患熱血痢方
粳米二升研
右一味研碎令米盡取汁可一大升於新磁瓶中盛取油絹密
閉頭繫內著井水中令至明飲之傳與人無不差者出第二卷中
古今錄驗療血痢及膿血方
黃連三兩
右一味切以清水三升漬一宿旦煎取一升半去滓分爲二
服服令須臾盡忌猪肉冷水文仲同
又療下痢鮮血方
乾地黃 犀角屑 地榆各二兩
右三味擣篩蜜丸如彈子大每服一丸水一升煎取五合去
滓溫服之
又療下血痢地膚散方
地膚五兩 地榆根 黃芩各三兩
右三味擣篩爲散以水服方寸匕日三並出第二卷中
久血痢方三首
病源此由體虛受熱熱折於血血滲入腸故成血痢熱不歇胃
虛不復故痢血久不差多變嘔噦及爲濕䘌出第十七卷中
崔氏療痢血數十年方

靜嘉堂文庫所藏

石灰（三大升熬令黃）

右一味以水一斗攪令清澄一服一升日三服止出第三卷中

小品療下血連歲不愈方

黃連（半斤）

右一味擣末以雞子白和為餅子微火炙令黃黑復擣篩飲服方寸匕日三有効下清血瘻黃失色醫不能療者皆差忌猪肉肘後同

文仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方

上黨人參（四分） 鹿角（去上皮取白處作末炒令黃）

右二味擣篩為散平旦以粥清服方寸匕日再並出第三卷中

蠱注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脉血氣漸至於藏腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢也毒氣侵食於藏腑如病蠱注之狀痢血雜膿瘀黑有片如雞肝與血雜下是也出第十七卷中

肘後療苦時歲蠱注毒下者方

礬石（二兩熬） 乾薑 附子（炮） 黃連（各二兩）

右四味擣篩為散以酒服方寸匕日三不止更服忌猪肉冷水

又方

黃連 黃蘗（等分）

右二味擣末蜜丸如梧子大飲服十丸日四服忌猪肉冷水並出第二卷中

古今錄驗療純痢血如鷄鴨肝并治蠱毒方

茜根 升麻 犀角 桔梗

黃蘗 黃芩（各二兩） 地榆 蘘荷根（各一兩）

右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未差更

靜嘉堂文庫所藏

作出第六卷中

腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於藏腑下血雜白如病蠱之狀名爲腸蠱也出第十七卷中

肘後凡痢下應先下白後下赤若先下赤後下白爲腸蠱方

牛膝三兩擣碎以酒一升漬經宿每服一兩杯日二三服姚同出第二卷中

膿血痢方七首

病源夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化爲膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脉微濇者爲內潰多下血膿又脉懸絶則死滑大則生脉微小者生實急者死脉沈細虛遲者生數疾大而有熱者死出第十七卷中

肘後療熱病久下痢膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩　梔子二七枚擘　黃連四兩　阿膠二兩炙

右四味切以水六升煑取二升分爲三服又一方加烏梅二十枚文仲同忌猪肉冷水出第二卷中

文仲治熱痢及下黃赤水及黃膿血四肢煩皮上冷者方

黃連八兩去毛　熟艾一兩　黃蘗四兩　黃芩三兩

右四味擣篩爲末以黃臘二兩安一升蜜中煑令消及煖和藥白飲服六七十丸如小豆日二夜一即斷大驗

又下久下痢膿血方

赤石脂一斤碎裹　烏梅二十箇　乾薑四兩　粳米一升

右四味切以水七升煑取令熟藥成服七合日三肘後同並出第三卷中

刪繁療下焦熱或痢下膿血煩痛痟惱或不出赤石脂湯方

赤石脂八兩　烏梅二十枚去核　梔子十四枚　白朮

蜀椒汗　升麻各三兩　乾薑二兩　粟米一升

右八味切以水一斗二升煮米熟去滓取七升下諸藥煮取五合服之忌桃李雀肉出第四卷中

備急葛氏云若挾熱者多下赤膿雜血方

黃連　竈突中塵各半兩

右二味末之酒服方寸匕日三服姚氏同忌猪肉冷水出第六卷中肘後云以棗膏和分作三丸日服一丸

古今錄驗療腸澼溏便膿血乾薑散方

乾薑　黃連　桂心各一分

右三味擣篩服方寸匕著糜中食日三多膿加薑多血加桂有驗忌猪肉冷水生葱

又療中寒下痢膿血附子散方

蜀附子一枚炮　麴　乾薑各三分

右三味下篩爲散先食以酒服方寸匕日二并療婦人漏下忌如前並出第三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入客於腸間腸虛則泄故爲痢也然其痢而赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸搏於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血狀如魚腦世謂之魚腦痢也出第十七卷中

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢日五十行方

鹿茸二分炙　石榴皮二分　乾薑二分　棗核中人七枚

赤地利一兩燒作灰肘後云赤罽如三指

靜嘉堂文庫所藏

右五味擣篩為散先食飲服方寸匕日三夜一若下數者可五六服肘後同

小品乆卒赤白下方

燒馬屎一丸作灰分服酒水隨意服已試良肘後同

深師療赤白下者黃連湯方

黃連　黃蘗　乾薑　石榴皮

阿膠三兩炙　甘草一兩炙

右六味切以水七升煑取二升分為三服日再忌海藻菘菜猪肉冷水出第二十六卷中

延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方

黃連六兩去毛　乾薑二兩　當歸三兩　阿膠三兩炙

右四味擣篩三年酢八合消膠令鎔和併手丸如大豆以飲服三十丸日再忌生冷滑猪肉冷水肘後同出第七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口即斷方

香豉心豉心謂合豉其中心者熟而且好不是去皮取心勿浪用之

右一味以取豉熔令乾香擣為末大者一大升豉心為四服服別以酒一大升小兒小升豉心還依劑為四服和之即止下小兒量其氣力與之出第九卷中

必效主赤白痢方

黃連二兩　阿膠四片

右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然後內膠令烊溫分三服忌猪肉冷水出第二卷中

乆赤白痢方四首

病源乆赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯乆不差也凡痢乆不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不

靜嘉堂文庫所藏

通故咳亦變爲䘌蟲食人五藏也三尸九蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五藏則心悁憹而悶齒齗脣白並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道開也輕者可治重者致死出第十七卷中

崔氏馬蘭子散療赤白痢腹內疞痛并久永穀痢色白如泔澱悉主之極重者不過三四日必差方

馬蘭子一升熬 地榆根皮八分 厚朴八分炙 熟艾八分

赤石脂一升 龍骨十分 茯苓十分 當歸十二分

右八味擣篩爲散一服方寸匕加至四五匕日再夜一白飲服出第三卷中

文仲療赤白痢五六年者方

燒大荆許臂大者

右一味取瀝服五六合即差肘後同

又卒腹痛下赤白數日不絕方

雞子一枚叩頭取黃去白 胡粉末令滿殼燒焦成屑

右二味以酒服之肘後同並出第三卷中

近効療赤白痢日數十行無問老小方

甘草二兩炙

右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

疳痢方六首

必効療冷疳痢方

取莨菪子熬令黃色

右一味擣爲末和臘月猪脂更擣令熟爲丸綿裹如棗許大以內下部中因痢出即更內新者不過三度即差出第二卷中

古今錄驗療五疳蒸下痢方

苦參三兩 青葙 甘草炙各三兩

靜嘉堂文庫所藏

右三味切以水四升煑取二升半分三灌即愈凡蒸但服生地黃汁即差忌海藻菘菜

又方

青黛　丁香　黃連各等分

右三味擣篩用甘淀和爲丸口中有瘡含之若下部有瘡以綿裹內下部日服五六十丸含之令下差

又方

丁香　麝香別研　石黛　石鹽

山楡人　小蘗皮　桂心　乾薑

青礬石燒　頭髮灰

右十味擣爲散著瘡上乾者和臘月猪膏煖著療時行病後食羊肉及肥膩或酒或房而得又蒸終變爲𤻲必須攻下部不可輕之忌生葱

又療𤻲濕䘌方

青葙　雄黃研　石硫黃研　蕪荑

雷丸各二兩　苦參　狼牙各三兩　藜蘆一兩炮

右八味擣篩爲散取如杏人大內下部中忌生葱狸肉

又療𤻲濕䘌神効方

黃連三兩　零陵香一兩半　犀角一分男　丁香三十枚

麝香一大豆　牛黃一大豆

右六味以水洗黃連零陵香丁香澄取清水去滓更以水添滿九升內黃連零陵丁香犀角煑兩沸然後著牛黃麝香煎一沸取一升分作三服如一日服不盡二日服亦得忌生冷酢滑猪肉魚三日內不得食菜並出第十卷中吳奏

師以九升先以一升者煑添盡九升取一大升分爲三服

又𤻲䘌及又䘌成𤻲方九首

靜嘉堂文庫所藏

廣濟療久患疳痢不差兀子礬散方

兀子礬八分燒 麝香二分研 吴白礬六分燒 雲母粉六分

桂心二分 龍骨六分 無食子七顆燒 黃連八分

右八味擣篩爲散空腹以生薑汁和三錢匕服日再煑薑湯下亦得忌生菜熱麪猪魚葵笋炙肉生葱蒜酢冷水

又療積年疳痢亭羸瘦面色痿黃方

石硫黃研 黃連各一兩 艾一兩 蜜一升

右四味以水二升先煑黃連艾取半升後内石硫黃末更煑三五沸即絞去滓又内蜜更煑三五沸下分爲三服忌猪魚蒜冷水並出第四卷中

必効療積久痢成疳灌方

樗根一握淨洗刮白皮擣絞取汁三合取時勿令見風日 麻子脂二合燒如車脂

酢泔淀二合 椒四合汁 豉二合

右五味以水六升取椒豉和煎絞取汁二升和樗汁麻油泔淀等三味分爲兩分用一分灌隔一日更取餘者復灌其藥欲用時溫溫即得忌酒肉油麪雞猪魚醬唯食煑飯葱白爛煑蔓菁芥等五六十日外鹿脯多少下飯亦得神効

又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或一二年不差變成疳所下如泔淀方

生羊肝一具

右一味取大酢一年以上者米麥並中年深唯佳取羊肝剥去上膜柳葉切朝旦空腹取肝手拈取酢中出吞之覺心悶則止不問還服之一日之間能不食粥飯盡一具羊肝者大佳不然除飽吞已外料理如生肝以薑虀下飯如常法食之日食一具肝不過二三具即永差後一月不得食熱麪油膩醬猪魚雞肉等

靜嘉堂文庫所藏

又療痔痢久不差羸瘦著牀欲死方

新出羊糞（一升淨擻揀）

右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之至日午如得食煑飯極重者不過三服

又療諸法丈夫婦人小兒久痢百方療不能差此方最効

丁香　麝香　黃連（各等分）

右三味擣篩為散以杏核大取竹筒吹入下部小兒及孩子量力減之不過三四廻差積年久痔痢不差裴光州云常用奇効備急同並出第三卷中

又療久痢變成痔下部覈生惡瘡惡寒壯熱者方

桃白皮（一升切）　槐白皮（亦然）　苦參（五合切）　艾（三月三日者五合熬）

大棗（十枚破）

右五味以水五升煑取二升半去滓內熊膽棗許大攪令匀取二升灌下部餘三分服

近効新附療久痢及痔痢諸方不差者此方必効

楝樗根白皮（不限多少當取時不用見狗及風）

右一味細切擣如泥取細麪捻作餛飩如小棗勿令破熟煑呑七枚重者不過七八服皆空腹服之忌油膩熱麪

又痔痢曉夜無度者方

取樗根濃汁（一雞子殼許）

右一味以和粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差其驗若神小孩兒減半用之醫人褚球録上

數十年痢方一十一首

千金療下痢丸主數十年痢下下氣消穀令人能食夏月長將服之令人不霍亂方

黃連　黃蘗　桂心　附子（炮）

靜嘉堂文庫所藏

乾薑各三兩　吳茱萸四兩　蜀椒半兩汗　麴一升熬
烏梅二升半　大麥蘗一升半
右十味擣篩蜜和食已飲服如梧子十九日三服至二十九亦
可至三十九忌猪肉冷水生葱等
又療數十年下痢消穀下氣補虛羸烏梅肉丸方
麴好者一升熬　附子二兩炮　大麥蘗一升熬　當歸三兩
桂心三兩　黃連　吳茱萸　烏梅肉熬令燥
乾薑各四兩　蜀椒一兩汗
右十味擣篩蜜和丸如梧子食已飲服十九日三忌猪肉冷
水生葱等
又四續丸主三十年痃痢骨立萎黃腸滑不療方
雲實五合　蠟五兩白者　附子二兩炮　女萎三兩
龍骨二兩
右五味擣篩爲末以臘煎烊以丸藥如梧子飲服五九日
三不過五六服必差其雲實熬令香忌猪肉冷水等千金名臘煎丸
又療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢沈重起
即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦轉筋起止須人扶除冷
無子椒艾丸方
赤石脂二兩別末　熟艾一升　乾薑三兩　蜀椒三百枚汗
烏梅三百枚醋漬剝取肉
右五味先擣篩薑椒爲末將熟艾梅肉著一斛酒飯下蒸
令飯熟內乾薑椒末赤石脂末合擣三千杵蜜和丸如梧子
飲服十九日三不差至二十九加黃連一升艾一斤忌猪肉冷水
等物
又療三十年痢不止方
厚朴炙　乾薑　阿膠各二兩炙　黃連五兩

靜嘉堂文庫所藏

石榴皮　艾葉各三兩

右六味切以水七升煮取二升分再服忌猪肉冷水

又療積久三十年常下神効方

赤松木皮去上蒼皮二斗

右一味爲散麪粥和一升服之日三即止不過服一斗永差

祕方三十年痢百日服差良並出第十五卷中

古今録驗療三十歳寒下及霍亂諸藥所不能療并腸滑若是蠱疰所中方

蓡子　艾屑各二　龍膽　續斷

白朮各三兩　蜀椒去目汗　附子炮　桂心

苦參　乾薑　甘草炙　鼠尾草各二兩

右十二味擣篩蜜和一歳兒服一丸如梧子三歳兒服二丸五歳兒服三丸大人服五丸飲下療寒熱氣塩塩在胷中卒氣

痛繞臍神良忌桃李雀肉生葱猪肉冷水海藻菘菜

廩丘公療下痢三十年方

茯苓　乾薑　黄連等分

右三味擣篩爲散蜜和丸如梧子飲服之一日漸增至百丸若痢劇者加龍骨附子炮還令分等一服十丸漸增之以知爲度忌猪肉冷水醋物等

又當歸湯療三十年下痢止諸痛方

當歸一兩　生薑八兩　大棗二十枚擘

右三味以水四升煮取一升半分作三服不差復作之

又云吾患痢三十餘年諸療無効唯服此方得愈也安石榴湯療大疰痢及白滯困篤欲死腸已滑醫所不能療方

乾薑二兩生薑倍之　黄蘗一兩細切　石榴一枚小者二枚　阿膠二兩別研漬之

右四味切以水三升煮取一升二合去滓内膠令烊頓服不差復

靜嘉堂文庫所藏

作療老小亦良人羸者稍稍服之不必頓盡頓更復服石榴
須預取之肘後同並出第二卷中（一方無黄蘗用黄連）
吳爽師療久痢方
龍骨　赤石脂　無食子（各六分）　地榆（三分）
熟艾（三分三月者良）　橡子　黄蘗（各五分）
右七味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五十丸日二服
稍加至六十丸
休息痢方五首
病源休息利者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣
動於飲則飲動而腸虛受之故爲痢也冷熱氣調其飲則靜
而痢亦休也腸胃虛弱易爲冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍
發乍止謂之休息痢也出第十七卷中
肘後療休息痢方
黄連（切）　龍骨（如鴨子大一枚）　膠（如掌大炙）　熟艾（一把）
右四味以水五升煮三物取二升去滓乃內膠膠烊分再服濃
煮乾艾葉亦佳又當煮忍冬米和作飲飲之忌猪肉冷水
又方
乾地榆（一斤）　附子（一兩炮）
右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作忌猪肉冷水
又方
龍骨（四兩）
右一味擣如小豆以水五升煑取二升半冷之分爲五服又以
米飲和爲丸服十九文仲同並出第二卷中
文仲葛氏若久下經時不愈者此名爲休息下療之方
取犬骨
右一味炙令黄焦擣篩飲服方寸匕日三愈肘後備急同

靜嘉堂文庫所藏

胡洽麹蘗丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療虛羸方

麦蘗（熬） 七月七日麹（熬各一升） 附子（炮） 桂心

烏梅肉（焙燥各二兩） 人參 茯苓（各四兩）

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子食前飲服十丸日三稍稍增之忌

猪肉冷水生葱大酢肘後備急同並出第三卷中

腹肚不調痢一首

廣濟療冷熱不調痢膿水方

人參 乾薑 枳實（炙各四分） 厚朴（炙）

龍骨 赤石脂 黃連 苦參（各六分）

黃芩（五分）

右九味擣篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二漸加服者

亦得出第三卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方

苦參、 橘皮 獨活 阿膠（炙）

芍藥 乾薑 黃蘗 甘草（炙）

鬼臼（各四分）

右九味擣篩蜜與膠共烊以和丸併手捻作丸如梧子曓燥

以飲服十丸日三不知稍加此方亦療諸疰下及卒下悉効

忌海藻菘菜等

又建脾丸療脾滑胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛方

附子（炮一兩） 蜀椒（汗一兩） 桂心（二兩） 赤石脂

黃連 人參 乾薑 茯苓

大麦蘗 陳麪（熬） 石斛 當歸（各二兩）

鍾乳（三兩研）

右十三味擣篩蜜和以酒服十丸如梧子日三稍稍加之忌猪

静嘉堂文庫所藏

肉冷水生葱酢出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便數至圊而不能便日數十行劇者下血并婦人產後餘疾腹絞痛方

附子（一枚炮）

右一味以猪脂如雞子黃大煎附子裂爲候削去上黒皮擣篩蜜和丸先食服如大豆三丸日三稍加可至十丸當長服之永不痢忌猪肉范汪同出第三卷中

下焦虛寒及遠血近血方二首

崔氏療下焦寒損或先見血後便轉此爲遠血或痢不痢伏龍肝湯方

伏龍肝（五合竈心土是也研）　甘草（一兩炙）　乾地黃（五兩）

燒髮灰（二合）　黃芩　牛膝　乾薑

生櫛脉　阿膠（各二兩炙）

右九味切以水七升煮七物取三升去滓下阿膠更煎取烊乃下髮分作三服忌海藻菘菜蕪荑

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此爲近血或痢下或不痢好因勞冷而發續斷湯方

續斷　當歸　桔梗　阿膠（炙）

桂心（各三兩）　乾薑　乾地黃　芎藭（各四兩）

蒲黃（一升）　甘草（二兩炙）

右十味切以水九升煮八物取三升五合去滓下阿膠更烊膠取沸下蒲黃分爲三服忌猪肉海藻菘菜生葱蕪荑並出第四卷中

下痢食完出及上入下出方一首

范汪溫中湯療寒下食完出方

甘草（炙）　乾薑（各三兩）　蜀椒（八十枚汗去開口及目）　附子（一枚炮四破）

靜嘉堂文庫所藏

右四味切以水二升煑取一升分再服若嘔內橘皮半兩小
與老皆取服之良忌海藻菘菜猪肉冷水出第十五卷中

下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方

女萎　半夏洗各二兩　附子炮　藜蘆炙去頭各一兩

右四味擣合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有下者
飲服三丸日三不知稍稍增之忌猪羊狸肉餳出第十五卷中

集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆宁出猪肝丸方

猪肝一斤炙令乾　黃連　阿膠炙　烏梅肉熬各二兩
胡粉七棊子

右五味擣下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加亦可散
服葛氏文仲胡洽同忌猪肉出第四卷中肘後云亦可散服

千金療下痢絞痛腸滑不可差方

黃連六兩　阿膠　鼠尾草　當歸
乾薑各三兩

右五味切以酒七升煑取三升去滓溫分三服若熱不絞
痛去乾薑加當歸以水煑之忌猪肉冷水菘菜海藻出第
十五卷中

大注痢及赤白困篤腸滑方二首

深師卒大注痢及赤白滯下困篤欲死腸已滑方

乾薑二兩生者焙　黃蘗　石榴皮各一兩　阿膠二兩半
漬豉一升　前胡四兩

右六味切以水三升煑取三合去滓內膠頓服不差更作
無毒宜老小羸人稍稍服之此湯兼療傷寒大下及赤白
困篤亦皆主之出第二十六卷中

范汪療得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數十行

靜嘉堂文庫所藏

腹中絞痛身熱如火頭痛如破其脉如濇方

黃連四兩　苦參二兩　阿膠一兩

右三味㕮咀以水一斗煑取二升去滓適寒温服二合日三少少益至半升服湯盡者復合以愈爲度曾試驗忌豬肉冷水古今録驗同

痢兼渴方二首

病源夫水穀之精化爲血氣津液以養藏腑藏腑虛受風邪邪入於腸胃故痢痢則津液空竭藏腑虛燥故痢而兼渴也渴而引飲即痢不止飜溢水氣脾胃已虛不能尅消水水氣流溢浸漬肌肉則變成腫也出第十七卷中

必効療痢兼渴方

麥門冬三兩去心　烏梅二七枚碎

右二味以水一大升半煑取強半絞去滓待冷細細咽之即定仍含之出第二卷中

古今録驗療熱渴痢方

冬瓜一枚

右一味以黃土厚一尺火炮穩約以水爛去土淨洗絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢有膿血相和痢有腸澼痢其水痢者本由脾氣熱消穀作水穀氣不停便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸致有此痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便致此痢腸澼痢者由積冷在腸腸間垢涹不能自固便有此痢色數雖多其源是一皆緣飲食不節將息失宜也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡唯變作水

穀無期度多食多下少食少下有此狀者宜依後黃芩等五味散服之方

黃芩 黃連 黃蘗各五兩 黃耆四兩

龍骨六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日二服稍稍加至二三匕服差乃止忌猪肉冷水等

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每遇冷便發有此候者宜依後附子等五味散主之方

附子炮 細辛 白朮各五兩 乾薑四兩

神麴一升熬

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良忌猪肉冷水生菜桃李雀肉等

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但兼血而下有此患者宜依後犀角五味散方

生犀角末五兩 阿膠炙四兩 黃蘗四兩 艾葉

乾薑各三兩一作乾藍

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿遇冷而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之方

麴末一升 乾薑六兩 丁香 豆蔻子各四兩

高良薑五兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿血相和痢候二物正等食不甚稀每出二物與食相兼腹亦小痛有此候者宜依後黃耆等五味散服之方

靜嘉堂文庫所藏

黃耆六兩炙　赤石脂八兩　厚朴五兩炙　乾薑

艾葉各三兩炙

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又腸澼痢候食稀或稠便但似膿每便極滑痢有常期有如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方

豆蔻子　丁香各三兩　細辛　附子炮

乾薑各四兩　人參　黃耆各五兩　赤石脂六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再稍稍加至二三匕良忌生葱猪肉冷水

又前件諸痢患無新舊如藥療之暫差還發此即縱以新藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結必須湯藥滌之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此候者宜依後附子等六味湯以利之後服高良薑十味散以補之方

附子炮　細辛　甘草炙　人參各二兩

乾薑三兩　大黃五兩

右藥切以水七升煑取二升四合去滓分溫三服服如人行十里久一服此湯當得快利利中有惡物如魚腦狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四日宜合後高良薑等十味散服之方

高良薑　細辛　黃耆　白朮

苦參各五兩　丁香二兩　人參　乾薑各四兩

豆蔻子三兩　赤石脂六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服之稍稍加至二三匕並出上卷中忌生菜桃李雀肉等吳昇同

靜嘉堂文庫所藏

外臺秘要方卷第二十六 痔病陰病九蟲等三十五門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

五痔方一十二首
五痔數年不差方六首
五痔脫肛方二首
腸痔方一十五首
諸痔方二十八首
痔下部如蟲齧方九首
大便下血風冷積年變作痔方三首
灸痔法二首
雜療痔方五首
脫肛方三首
肛門凸出方三首

靜嘉堂文庫所藏

卒大便脫肛方六首
腸肛俱出方二首
脫肛歷年不愈方三首
疝氣及癩方六首
卒病癩方五首
癩卵偏大方三首
灸諸癩法一十四首
陰腫方六首
陰疝腫縮方一首
陰卒腫痛方三首
陰囊腫痛方五首
陰下癢濕方七首
陰痛方三首

陰瘡方七首
陰邊粟瘡方五首
著硇砂方四首
九蟲方一首
五藏蟲方七首
長蟲方二首
蚘蟲方九首
寸白方一十九首
蟯蟲方六首
三蟲方七首
雜療蟲方三首
五痔方一十二首

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血

靜嘉堂文庫所藏

出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良乆肯入者名氣痔也此皆坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不爲患乆乆不差終能困人別有大方今單行亦要便宜依按用之肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方

生槐煎五分　皂角二兩炙去皮子　麝香研　鰻鱺魚炙

雄黃研　莨菪熬　丁香各二分　木香二分

右八味擣篩以槐煎和丸分爲五丸取一淨瓶可一升以來掘地埋之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內火瓶中灰蓋之然內藥一丸燒之令安穩以下部著疊孔上坐便通汗其盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立効仍不及薰忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方

蝟皮炙　龜甲炙　當歸各六分　黃耆

槐子　大黃各八分　蛇皮五寸炙　露蜂房五分熬

藁本　桂心各五分　猪後懸蹄甲十四枚炙

右十一味擣爲散空腹以米飲服方寸匕日二漸加一匕半不利忌麪炙肉雞魚葱蒜

又療五痔下血不止方

槐子　五色龍骨　槲葉炙令紫色　乾薑

芎藭　當歸　蒨根　吳茱萸各六分

白斂　附子五分炮　黃耆八分　大黃十分

猪懸蹄甲十四枚炙　髮灰四分

右十四味擣篩蜜丸空腹以飲服如梧子二十丸日二漸加至四十丸若利恐多以意減之忌生冷炙肉猪魚蒜出第四卷中

靜嘉堂文庫所藏

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱橫
出及肉方
赤小豆四分熬　黃耆三分　附子炮　白斂
桂心各一分　芍藥　黃芩各二分
右七味擣為散以酒服方寸匕日三止血大驗文仲備急集
驗同
又方
藜蘆　大黃　黃連各半兩　練木子十四枚
桃人十四枚去皮　巴豆四枚去皮心　萆麻十四枚一名狗蜱
右七味㕮咀以猪肪一升煎三沸下去滓傅贅肉上日三外
著此膏內服紫參丸常併行古今錄驗同
又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療久不差服之無不差方
紫參　秦艽　亂髮灰　紫菀

厚朴炙各一兩已上　藁本二兩　雷丸半升　白芷一兩
䗪蟲半兩熬　石南半兩炙　貫衆三兩去毛　猪後懸蹄甲十四枚炙
䖟蟲半兩去翅足熬
右十三味擣篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和丸如梧
子未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜一服四日肛邊
痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服益
善有痔病十八年肛出長三寸服此方即愈亦療脫肛有人
熱可除羊髓以赤蜜代集驗備急千金同禁生冷魚肉
集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如
鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鼈甲主之牝痔從孔中起外腫
五六日自潰出膿血猬皮主之腸痔更衣挺出久乃縮牡猪左
懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之方
右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦早以井

靜嘉堂文庫所藏

花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服忌冷食猪肉生魚菜房室唯得食乾白肉病差之後百日乃通房內又用藥內下部有瘡內中無瘡內孔中千金删繁文仲同

又方

野葛燒末

右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日愈徐安用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮桃根洗之千金備急同並出第九卷中

删繁療五痔桃葉蒸痔方

桃葉一斛　細糠　胡麻各一斗熬

右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口甕中將肛門坐桃氣熏入肛門蟲出當死出第十七卷中

千金療五痔方

猬皮方三指大切　熏黃如棗大　熟艾鷄子大

右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎雞猪魚生冷二十日內補之

又方

桑耳

右一味作羹美空腹下飵飽食之三日食之待孔卒痛如鳥啄取大豆小豆各一升合擣作兩囊中蒸之及熱更互坐之即差並出第二十四卷中

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄為病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發方

槐子　乾漆熬一　樧木根皮各四兩樧茱萸　秦艽

黃芩　白斂　青木香一　牡蠣熬一

靜嘉堂文庫所藏

龍骨　附子炮八角者　雷丸　蒺藜子
白芷　桂心　雞舌香各二兩　黃耆二兩
右十六味擣篩蜜和爲丸一服二十丸日三服忌猪肉冷水雞
魚蒜生葱　千金翼同　千金翼有丁香茱萸根皮無雞舌香欓木根皮
千金小槐實丸主五痔十年方
槐子三斤　龍骨十兩　礬石燒　硫黃各一斤
白糖二斤　大黃十兩　乾漆十兩熬
右七味擣篩石二種及糖並細切內銅器中一石米下蒸之
以綿絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如梧子大陰乾一
服二十丸日三服深師同
又槐酒主五痔五十年不差方
槐東南枝細剉一石　槐東南根細剉二石　槐白皮剉一石
槐子一石

右四味大釜以水十六石煮取五石澄取清更煎取一石六斗
炊兩石黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲
日三四適寒溫量性常令小小醉耳合時更煮滓取汁濤
米洗器不得用生水此藥忌生水故也深師并翼同
又方
塗熊膽取差乃止但發即塗一切方皆不及此救
急并翼同並出第二十四卷中
古今録驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生
痤横肛中此牡痔肛邊生乳此牡痔皆飽勞氣所生方
大黃如金色者十兩　滑石七兩研碎　芒消三兩　桑白皮二兩
棗三十枚擘　黃芩五兩　杏人二兩研
右七味切以酒一斗二升煮取二升盡服之當下以大骨羹補之
又療十年痔如鼠乳膿出便作血劇白斂散方
赤小豆四分　黃耆三分　芍藥二分　白斂二分

靜嘉堂文庫所藏

黃芩三分 桂心三分 蜀附子炮 牡蠣各二一分熬

右八味擣篩爲散酒若泔汁服方寸匕日三服忌猪肉生葱

並出第三十卷中

五痔脫肛方二首

千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方

槐白皮二兩 薰草 辛夷 甘草

白芷各半兩 冶葛六銖 巴豆七枚去皮 漆子七枚

桃人十枚去皮 猪脂半斤

右十味切以猪脂煎三上三下去滓以綿突膏塞孔中日四五過蟲死差止痒痛大佳出第二十四卷中薰草肘後作薰陸

必効五痔脫肛方

以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方

以蒲黃水服方寸匕日三差備急文仲崔氏千金古今録驗並同

又方

礬石熬 附子炮各一兩

右二味擣篩蜜丸如梧子服二丸酒下日三稍增百日永差不發忌猪肉冷水備急文仲崔氏千金同

又方

以鯉魚作鱠薑虀食之任性多少良崔氏用鯽魚

又方

常食鯽魚羹及蒸隨意任之備急文仲同並出第三卷中崔氏用鯽魚

文仲療腸痔方

以槐木上耳擣末飲服方寸匕日三肘後古今録驗千金同

又方

白薔薇根 枸杞根各二分暴乾

靜嘉堂文庫所藏

右二味擣篩爲末服方寸匕日三五六日當更小腫是中病
至公傳將服勿止崔氏備急肘後同

又方
生地黃一斤切 酒二斗
右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急同

又方
取枳根皮末飲服方寸匕日三亦可煮汁常飲肘後
備急崔氏同

備急療腸痔方
以穀子燒末傅之深者導之文仲崔氏同

又方
以槐白皮一擔剉水煮令濃脱衣入中坐當如欲大
便狀冷更易不過三蟲出

又方
擣槐白皮作屑粉以導之崔氏文仲千金必効同

又方
以蘩蔞燒灰礬石熬和爲粉粉之崔氏文仲范汪
同出第六卷中

删繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱
得之好挺出良久乃縮而瘡生猪懸蹄青龍五生膏方
猪懸蹄甲三枚炙 生梧桐白皮四兩 生龍膽五分 生桑白皮五分
蛇蜕皮五分 雄黃五分 生青竹皮六分 生柏皮七分炙
露蜂房炙 蜀椒汗各三分 蝟皮 附子炮各四分
杏人二十枚去皮
右十三味細切綿裹以苦酒二升浸一宿於火上炙燥擣篩以猪
脂三升和微火煎之如薄糖傅并酒服如棗核出第七卷中

崔氏療大便後出血此腸痔之疾宜服薤白湯方
薤白切七合 羊腎脂一升
右二味緩火煎令薤白黃去滓頓盡未差更服即止得臘
血與糞相和即差便可服後方

又方
白礬燒汁盡 附子炮去皮 乾薑各一兩

靜嘉堂文庫所藏

右三味擣篩蜜和飲服二丸至三丸日二服忌猪雞酒麪生冷魚油膩等並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方

以蛇不問多少煎煑肉消盡去滓用汁和婆羅粥著少鹽食之大効一無所忌

又黃耆丸方

黃耆　枳實炙各三兩　烏蛇炙　當歸

赤石脂各二兩　蝟皮炙三兩

右六味擣篩蜜丸空腹酒下如梧子二十丸日二服更不加減不利忌麪猪肉魚蒜陳臭物並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方

黃連二兩　麴一兩用七月七日者

右二味擣篩薄蜜溲先食以飲服五分匕日三不知增至方寸匕

集驗療痔猬皮丸方

猬皮一具細切熬令焦　附子炮二兩　當歸二兩　連翹二兩

乾地黃五兩　乾薑二兩　礬石二兩燒令汁盡　續斷

黃耆各一兩　槐子三兩

右十味擣篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三十丸亦主瘻常用大驗忌猪肉冷水肘後備急文仲删繁千金古今錄驗同

又方

以生槐皮十兩削去黑皮熟擣丸如彈子綿裹內下部中大効備急千金同

又方

以槐赤雞一斤爲散飲服方寸匕千金云槐檽也

千金療痔神方

靜嘉堂文庫所藏

以七月七日多採槐子熟擣涎取汁重綿絞內銅器中盛庭中高門上暴之二十日以上煎成取如鼠糞大內穀道中日三亦主瘻及百種瘡救急崔氏古今錄驗同

又方

鯉魚腸三具以火炙令香

右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡數枚當差一方去坐上蟲出古今錄驗同

又方

虎頭骨炙 犀角

右二味各爲末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救急深師同並出第二十四卷中

崔氏療痔方

雀林草一大握麤切

右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑無不差者

又方

取駱駝頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之並出第四卷中

必効熨痔法痔頭出或疼痛不可堪忍方

取枳實塘灰中煨之及熱熨病上盡七枚立定發即熨之永除也

又方

以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方

以野猪肉炙食十頓即差三方云奇効

又方

取五月五日蒼耳子陰乾擣末水服三寸匕日三差乃止

靜嘉堂文庫所藏

又方

以二十年久鍼綖袋口燒作灰分和水服

又痔正發疼痛方

以葱和鬚濃煑湯置盆中坐浸之須臾即當痛止

又方

以狸肉作羹食之或作脯食之不過三頓無不差

又方

以肥大棗一顆剥去赤皮取水銀掌中以唾研令極熟塗棗瓤上內下部中差

又方

以萹蓄根葉擣汁服一升一兩服差

又方

薑屑二兩 小秤

右一味以水三大合煑之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

倚死竹色黑者取之折斷燒爲灰篩和薄飲服之方寸匕忌牛肉餘無所忌出第三卷中

古今録驗療痔黄耆丸方 是直殿中省散騎常侍郎甄立言處

黄耆　青葙子　漏蘆　鼈甲炙

狼牙各五分　黄蘗四分　猪懸蹄甲七枚炙　蝟皮四分炙

白礬十分燒去汁　芫青去足翅　斑猫去足翅熬　地膽去足翅熬

蜈蚣各十枚炙　犀角屑八分

右十四味擣篩爲散蜜和丸如梧子大空腹以飲服二丸日二增之以知爲度忌一切油膩人莧菜

又方

掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以犢魚著口上取莨菪子一合內坑中燒煙出痔人坐上以被擁當汗出密屋內作之以煙盡更著一合莨菪子盡避風如發汗法則差

又療諸痔及下血不止轉虛羸者服之無不効方

黄耆原州者　枳實商州者各二大兩半細剉熬令黄

黄礬石一大兩炭火燒經一復時仍數翻轉令匀著火冷訖細羅去沙㲉

靜嘉堂文庫所藏

右三味先擣黃耆枳實篩訖然和礬石更擣勻蜜和丸空腹
以酒下二十丸加至三十丸日再服忌蕎麪猪肉蒜魚勞事唯
久服一年半年愈良驗

又療痔方

鯉魚腸 可半升

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可闊二尺以來厚二寸當
中鑿孔深一寸半圓如醬盞口大布魚腸於其內以好麝
香碎末摻魚腸取厚氈二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以
被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是蟲出也時
且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入於腸中蟲可長二三寸許
細如綱絲斑作五色每出不過十餘枚不勤度數蟲盡即止
許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下
部有孔每便血從孔中出內痔每便即有血下血甚者下血擊

地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候
者宜依後藥方

生槐子 一斗候未堅硬時採

右一味擣令碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾擣篩爲散和
槐子煎作丸以飲服十丸日再加至三十丸如梧桐子大兼以
煎撚作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可擣苦參末
代地膽 一方地膽作地脉草藥中無地脉惟有地麥

依前生槐子煎不覺可宜合後黃耆十味散服之方

黃耆五兩 苦參 玄參各六兩 附子炮
大黃各三兩 乾薑二兩 蝟皮炙二兩 黃連各四兩
槐子六合 猪懸蹄甲一具炙

右藥擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日再服之漸漸加至二
匕忌猪肉冷水出下卷中

靜嘉堂文庫所藏

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉　水銀

右二味以棗膏調勻綿裹夜卧內穀中導之効崔氏同

又方

以菟絲子熬令黃黑末以雞子黃和塗之集驗文仲備急范汪崔氏等同

又方

以杏人熬令黑擣取膏塗之集驗備急文仲崔氏同

又方

以蝟皮燒灰傅之又獺肝燒擣散服之崔氏備急文仲同

又方

以温湯令熱內少礬石以洗之良崔氏同並出第二卷中

文仲療痔下部如蟲齧方

擣桃葉一斛蒸之令熱內小口器中以布蓋上坐之蟲死即差肘後崔氏備急同一方有烏梅

又方

掘地作小坑燒令赤以酒沃中擣吴茱萸三升內中及熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃下不過三度即差肘後崔氏備急同

又方

以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止擣末以酒服方寸匕日三崔氏備急同

又方

以豬椒子一升酒一升漬經五日稍稍飲一日令盡佳崔氏同出第六卷中

大便血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合面少血色此是內傷風冷積年多變作痔方

大黃五分　甘遂三分　黃芩二分　乾薑

附子各四分炮　桃人三七枚去皮尖　葱白七莖

右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌豬

靜嘉堂文庫所藏

肉等

又方　煑桃皮李皮萹蓄苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方

燒稻藁灰淋汁煎熱漬之三五度佳崔氏肘後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法

以繩圍病者項令兩頭相拄展繩從大椎正中量之垂繩一頭當脊正下以墨點訖又量病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使相當所三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法　令疾者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至尾株骨尖頭訖再折繩更從尾株尖頭向上量當繩頭即下火高虢州初灸至一百壯得差後三年復發又灸之便斷兼療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻疽瘡方

光明砂別研　麝香當門子別研　蛇皮五月五日者熬

右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡上傅少蜜以散傅上差止

小品療穀道中痒痛痔瘡槐皮膏方

槐皮五兩　甘草　當歸　白芷各二兩

陳豉　桃人各五十粒去皮　赤小豆二合

右七味㕮以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以塗之日三度集驗同

刪繁療虛勞寒下痢不止肛邊生肉如鼠乳在大孔傍時

靜嘉堂文庫所藏

時體血出名牡痔鼈甲丸方

鼈甲炙　乾地黃　黃連　連翹各七分

栝樓　黃耆　乾薑各六分　蠐螬五枚炙

猬皮炙　續斷各五分　附子炮　槐子

礬石燒汁盡各四分

右十三味擣篩以蜜丸如梧桐子大飲下二十丸漸加至三十丸日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所爲酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三兩炙　生槐白皮十兩　楝實　桃人各五十枚熬

白芷二兩　赤小豆一合碎　猪膏一升半

右七味㕮咀綿裹以苦酒一升漬二宿下膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大綿裹內肛門中又酒服一方寸匕出第三卷中

必效療痔及諸蟲方

石榴東引根深者取一握

右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片炙兩畔令熟搥細擘以水三升煮取一升適寒溫空腹頓服之其患痔盛發者服即定諸蟲無問赤白並出差出第三卷中

脫肛方三首

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所爲肛門爲大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣嘔而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也出第十七卷中

小品療脫肛熏方

以女萎一升以器中燒坐上熏肛門即愈范汪集驗千金同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便道肺大腸合也號爲通事令史重十二

靜嘉堂文庫所藏

兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若藏傷熱即肛閉塞大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之不虛不實依經調之療肛門主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兊通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得丸長六七寸許兊肛門中到身中向上入頭向下停少時兊烊斯須即通泄千金同出第三卷中

千金療肛出方

磁石四兩研　桂心一尺　猬皮一枚炙黃

右三味擣篩爲散服方寸匕一日服十服即縮勿舉重及急帶衣須斷房室周年乃佳出第二十五卷中

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出猪肝散方

猪肝一斤炙令黃燥　黃連　阿膠炙　芎藭各二兩

烏梅肉五兩熬　艾葉一兩熬

右六味擣篩平旦空腹溫服方寸匕日再若不能酒白飲服亦得千金同出第三卷中

千金肛門凸出壁土散方

故屋東壁土一升碎研　皂莢三挺長一尺二寸者

右擣土爲散裛粉肛門頭出處取皂莢炙煖更遞熨之取入則止

又麻履底按入方

麻履底　鼈頭一枚

右二味燒鼈頭爲散傅肛門凸出頭炙履底以按熨令人永不出矣並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方

靜嘉堂文庫所藏

灸頂上迴髮中百壯

又方

以豆醬清合酒塗之文仲備急同

又方

燒虎骨末水服方寸匕日三即差

范汪療卒大便脫肛方

以緑桑枝螺取燒末猪脂和傅之立縮亦可末以粉之備急張文仲同出第三卷中

千金療卒大便脫肛方

以猪膏和蒲黃傅之指推内之但以粉粉之亦佳張文仲備急同

又方

灸鳩尾骨上七壯備急文仲集驗同出第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方

擣生栝樓取汁温服之以猪肉汁洗手隨抑按自得入効范汪小品張文仲備急千金同

備急若腸隨肛出方

熬石灰令熱布裹熨之隨按令入冷即易小品文仲備急同出第八卷中

脫肛歷年不愈方三首

集驗療脫肛歷年不愈方

以生鐵三斤以水一斗煑取五升以洗之日再范汪千金備急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方

以死鼈頭一枚燒令煙盡作屑以傅肛門上手按之令入兼灸横骨一百壯

又方

以鐵精粉上按令入即愈並出第二十五卷中

𤵜氣及癩方六首

靜嘉堂文庫所藏

廣濟療㿗氣核腫疼方

黃耆 八分 桃人 去尖皮熬 山茱萸 五加皮

檳榔人 各八分 蒺藜子 二十分熬 海藻 洗八分 玄參 十分

五味子 十八分 牛膝 六分 茯苓 六分 蓯蓉 八分

枳實 炙 人參 續斷 各六分 桂心 八分

遠志 去心 石南 各五分 龍骨 八分

右十九味擣篩蜜丸如桐子大酒服三十丸日二漸加至四十丸忌熱麪生葱大酢粘食等物

又療腎虛㿗氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰丸方

狐陰 一枚炙 木香 蒺藜子 膃肭臍

昆布 各六分 牛膝 菟絲子 各八分酒漬 桃人 去尖皮熬

石斛 各十分 檳榔人 十枚

右十味擣篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十丸至三十丸日再服忌熱麪蕎麥猪魚粘食等物並出第二卷中

集驗療㿗方

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熱以故布乾掩腫處取熱柳枝更互拄之如此取差止文仲備急千金同

千金療㿗方

桃人 五十枚去皮尖熬 桂心 二兩 澤瀉 二兩 蒺藜子 二兩

蜘蛛 五十箇熬 防葵 二兩 細辛 二兩 橘皮 二兩

茯苓 二兩 五味子 二兩 芍藥 二兩 地膚子 二兩

牡丹 二兩 海藻 二兩洗 狐陰 一具炙

右十五味下篩蜜和服十丸如梧子大稍加至二十丸忌胡荽生葱生菜酢物出第二十五卷中

備急療㿗方

靜嘉堂文庫所藏

以桃人擣薄之亦療婦人陰腫乾卽易集驗同出第五卷中

古今錄驗療癩蒺藜丸方

蒺藜子 乾地黃各十分 鹿茸十分炙 白斂八分

礠石十分研 礬石十分燒 鐵精 桂心

續斷各五分 巴戟天 芍藥 玄參

通草 升麻 牛膝 寄生各八分

澤瀉七分 射干八分 茯苓十分 海藻八分如髮者

右二十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大飲下十丸日二漸增

至二三十丸忌生葱蕪荑生血等物甄立言處出第四十一

卷中

卒病癩方五首

肘後療超躍舉重卒得陰癩方

白朮五分 地膚子十分 桂心一分

右三味擣末以飲服一刀圭日三忌生葱桃李雀肉等物古

今錄驗同

又方 狐陰一具炙 海藻 牡丹各三分 桂心二分

右四味擣篩爲散蜜和爲丸如梧子大小兒服五丸大人增

之忌胡荽生葱

集驗灸卒癩法

以蒲橫度口折之一倍增之以布著小腹大橫理令

度中央上當齊勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨年

壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼喚千金范汪同

又法

牽陰頭正上行灸莖頭所極又牽下向穀道又灸所

極又牽向左右髀直下行灸所極皆使正直勿偏四

處灶隨年壯佳千金范汪同

又法

灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也千金范汪

靜嘉堂文庫所藏

同並出第九卷中

㿗卵偏大方三首

千金療㿗疝卵偏氣上方

牡丹　防風各一分

右二味擣爲散温酒服方寸匕日二忌胡荽出第二十五卷中

張文仲小品牡丹散療㿗偏大氣脹方

牡丹　桂心　防風　鐵精　豉熬各等分

右五味擣篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆與之大効忌生葱胡荽肘後同出第七卷中

古今錄驗牡丹五等散療㿗疝陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方

牡丹皮　防風　黃蘗炙　桂心各一分

桃人二十分去皮尖研

右五味擣爲散以酒服一刀圭二十日愈少小㿗疝最良小兒以乳汁和如一大豆與之長宿人服方寸匕忌生葱胡荽出第四十一卷中

灸諸㿗法一十四首

千金論曰男㿗有腸㿗卵㿗氣㿗水㿗四種腸㿗卵㿗難差氣㿗水㿗鍼灸易差

又卵偏大上入腹法

灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

又男陰卵偏大㿗法

灸肩井解臂接處隨年壯男㿗灸手小指端七壯㿗在左者可灸左在右者灸右良効差止

又法

灸關元百壯

又法

灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

靜嘉堂文庫所藏

又法　灸泉陰百壯三報之在横骨邊三寸

又癩病陰卒腫者法

令並足合兩拇指爪相並以一艾丸灸兩爪端方角處

一丸令頓上兩爪角也令丸半上爪上七壯

又兩丸縮入腹法

灸三陰交隨年壯神効

又男陰卵大癩病法

灸足太陽五十壯三報之

又法　灸足太陰五十壯穴在内踝上一夫

又法　灸大拇指内側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙灸之

又法　灸横骨兩邊二七壯夾莖是也

又法　灸足大指理中十壯隨邊腫灸之

灸小兒癩法

先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一灸訖便牽小兒令雀頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽簪頭大耳

又法　凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯即愈並出第二十五卷中

陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故致腫也出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方

以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生用切水一斗煑取二升以洗之忌海藻菘菜千金有礬石二兩文仲用礬石

又方　取莧菜根擣薄之范汪千金同

又方　取蔓菁根擣薄之范汪同

靜嘉堂文庫所藏

又方

擣馬鞭草薄之范汪同並出第九卷中

文仲療陰腫方

取桃人去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差千

金備急同出第七卷中

古今録驗療腫大如斗方

取雞翅燒灰飲服其毛一孔生兩毛者佳腫在左取左翅

在右取右翅雙腫取兩邊翅出第四十一卷中千金治小兒卵腫

陰𤸷腫縮方一首

病源𤸷者氣痛也衆筋會於陰器邪客於厥陰少陽之經與冷

氣相搏則陰痛而攣縮也出第四卷中

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰𤸷方

狼毒四兩炙　防葵一兩　附子二兩炮

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三夜二忌猪肉冷水

古今録驗范汪同出第七卷中肘後用防風不用防葵

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方

灸足大指第二節下横理文正中央五壯姚云足大

指本三炷出第七卷中亦治小兒陰𤸷發時腫痛隨痛左右灸之

備急療男子陰卒腫痛方

雞翮六枚燒　蛇床等分

右二味爲末以飲服少許隨卵左右取雞羽集驗同姚方無蛇床

又若有息肉突出方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗一日夜三四度

差肘後同出第五卷中

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠睡方

靜嘉堂文庫所藏

取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消爲効乃止

又方

煑大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方

醋和麫灸令熱熨之

又方

以醋和麫塗之

又方

釜月下土以雞子白和傅之効肘後同並出第二十五卷中

陰下痒濕方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘之則搔痒也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云卧令兩手布膝頭取踵置尻下以口内氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裏痛膝冷不隨出第四卷中文

仲療陰痒生瘡方

嚼胡麻塗之驗肘後千金同

葛氏療陰囊下濕痒皮剝方

烏梅十四枚 錢四十文 鹽三指撮

右三味以苦酒一升於銅器中浸九日洗之効肘後同

又方

煑槐皮若苦參黃蘗及香薷汁洗之並良肘後同出第七卷中

救急療陰下濕痒成瘡方

猪蹄兩脚 槐奇重裹白皮一切升

右二味斟酌以水煑洗瘡一日五六遍永差

又方

煑桃皮和黍米汁洗之並出第五卷中

古今錄驗療陰下痒濕湯洗方

甘草一尺以水五升煑取三升漬洗之日三四度便愈

又療陰下濕痒生瘡方

靜嘉堂文庫所藏

吴茱萸一升水三升煑取三五沸去滓以洗瘡諸瘡

亦治之出第四十一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損爲風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊眞邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾熱者則腫其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩足指向下柱席兩涌泉相拓坐兩足跟頭兩膝頭外扒手互前向下盡勢七通去勞損陰膝冷出第四卷中

集驗療卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜一斤 韭根一斤一方無 楊柳根一斤

右三味合燒以酒灌之及熱氣熏之即愈千金同出第九卷中

千金療陰腫痛方

灸大敦三壯

又方

車前子末酒服之佳出第二十五卷中

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則爲風邪所乘邪客腠理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方

地榆 黃蘗各八兩

右二味切以水一斗煑取六升去滓適寒溫洗瘡日再

只以黃蘗湯洗亦効

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門内並似甘瘡作畔𠜱食之大痛甘即不痛方

用銀釵以綿裹用臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙瘡上令熟取乾槐枝爇塗之以麝香黃礬青礬

靜嘉堂文庫所藏

末傅之小便後即傅之不過三兩度差但用甘𦵔
方中藥傅之即差出第二十五卷中

葛氏療男子陰瘡方

爛煑黃蘗洗之又用白蜜塗之

又方

黃連黃蘗各等分末之先煑肥猪肉湯洗之然
後以藥粉之

又方

以蜜煎甘草末塗之大良比見有人患塗頭腫坎
下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之又
依陶方即差神驗出第七卷中

必効療陰生瘡膿出作臼方

高昌白礬一兩

右一味擣細研之鍊猪脂一合於瓷器中和攪作膏取槐
白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏傅上及以楸葉貼上

不過三兩度永差肘後有細辟人等分同研

古今錄驗療陰瘡方

黃蘗　黃連各三分　胡粉一合

右三味擣爲末粉上日三婦人綿裹棗核大內之出第
四十一卷中

陰邊粟瘡方五首

必効療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒方

以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以
水二大升煑取一升洗之日三五遍適寒溫用若
涉遠恐衝風即以米粉和塗之神効

又療陰瘡有二種一者作臼膿出名曰陰蝕瘡二者但赤作
瘡名爲熱瘡若是熱瘡用此方

取黃蘗黃芩各一兩切作湯洗之用黃連黃蘗

静嘉堂文庫所藏

末粉云神良
又方　以黃連和胡粉末傅之必効
又方　紫笋茶末一分　荷葉一片燒灰
右二味爲末以鹽漿水洗訖傅之三五度即愈
又方　取停水處乾卷地皮末傅之神効是長安郭承
恩用之得効出第四卷中

著硇砂方四首

救急避迮著硇砂損陰方
猪蹄一具擘破　浮萍草三兩
右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁内陰瓶中
漬之冷即出拭乾便傅後藥粉之
又粉法
薔薇根皮　黃蘗各三分　朴消　蛇床子各一分
甘草二分炙
右五味擣爲散用前法浸洗後以粉瘡上亦不甚痛愼
風出第八卷中
必効主著硇砂方
取雞子一枚煑熟剥取肉更用生雞子二箇傾取白
和熟研令細以帛裹之立定李饒州云奇効
又方　甘草　黃蘗　白礬燒令汁盡
右三味爲末傅之瘡上並出第四卷中

九蟲方一首

病源夫九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰白蟲
長一寸四曰肉蟲狀爛杏五曰肺蟲狀如蠶形六曰胃蟲狀如蝦
蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細
微形如菜蟲伏蟲群蟲之主也蛔蟲貫心則殺人白蟲相生子

靜嘉堂文庫所藏

孫轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居胴徒棟切大腸也腸多則爲痔劇則爲癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘻瘑疥䶬蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無者此諸蟲依腸胃之間若腑藏氣實則不爲害若虛則能侵蝕隨其蟲之動而變成諸患也出第十八卷中集驗同

集驗貫衆丸主療九蟲動作諸病方

貫衆熬　石蠶熬五分　狼牙四分　藋蘆二分作藜蘆

蜀漆六分炙　殭蠶三分熬　雷丸六分　蕪荑四分

厚朴三分　檳榔六分

右十味擣篩蜜和爲丸空心煖漿水服三十丸日三不知稍稍加之白蟲用榧子湯服備急文仲古今録驗范汪同出第九

卷中

五藏蟲方七首

刪繁療脾勞有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔而胷中駭駭一作立立嘔而不出前胡湯方

前胡三兩　白术三兩　赤茯苓三兩　枳實二兩炙

細辛三兩　旋復花一兩　常山三兩　松蘿二兩

龍膽三兩　竹葉切一升　杏人三兩去尖皮

右十一味切以水一斗煑取三升去滓分三服若腹中熱滿下芒消三兩梔子三兩黄芩三兩苦參二兩加水二升依方煎忌桃李雀肉大酢生葱生菜等

又療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔茱萸根下蟲湯方

茱萸東引根大者一尺切　大麻子八升　橘皮二兩切

右三味切擣麻子爛並和煎服或下黄汁凡合藥禁聲勿語道

靜嘉堂文庫所藏

作藥蟲當聞便一不下切須忌之甚驗以水煎服臨時量之効

又療肺勞熱損主肺蟲形如蠶在肺爲病令人欬逆氣喘或謂憂恚氣膈寒熱皆從勞之所生名曰膏肓鍼灸不著麥門冬五膈下氣丸方

麥門冬十兩去心　蜀椒四分汗　遠志皮　附子炮各六分

乾薑五分　甘草十分炙　人參七分　細辛六分

桂心五兩　百部根　白朮　黃耆各五分

杏人四十枚去皮尖雙人者熬　檳榔五分

右十四味擣篩蜜丸如彈子許含一丸稍稍嚥汁忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉等

千金療腎熱四肢腫急蟯蟲如菜中蟲生腎中爲病方

貫衆大者三枚熬　乾漆二兩熬　茱萸六分一云五十枚　杏人四十枚去皮尖熬

蕪荑　胡粉　槐白皮各四分

右七味擣散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生蟲在肺爲病方

東行桑根白皮切一升　東行茱萸根切五兩　狼牙三兩

右三味切以酒七升煑取一升半平旦服盡

又療肝勞生長蟲在肝爲病令人恐畏不安眼中赤方

雞子五枚去黃　東行茱萸根切三升　臘三兩

乾漆四兩熬　粳米粉半升

右五味擣茱萸皮漆爲末和藥銅器中打雞子調火鍊可丸如小豆宿勿食旦以飲服一百二十丸小兒五十丸蟲即爛出差

又療心勞熱傷心有長蟲名蠱長一尺貫心爲病方

雷丸熬　橘皮　桃人各五分去皮尖　狼牙六分

貫衆三枚　蕪荑　青葙子　乾漆一兩熬

亂髮如雞子燒　殭蠶二七枚熬

靜嘉堂文庫所藏

右十味擣篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之並出第十
八卷中

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方

雞子白三枚　乾漆四兩熬一本無　臘三兩　粳米粉半斤

右四味內銅器中於微火上煎攪令調內粉令凝可丸下置
土上少溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下
小豆許大一百二十丸小兒五十丸效驗

又方

取楝實以淳苦酒中漬再宿以綿裹內下部中令入
三寸許一日易之千金范汪同並第九卷中

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑藏虛
弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作種聚行來
上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水貫傷心者則死
診其脉腹中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則蛔蟲也出第
十八卷中

廣濟療蛔蟲方

酸石榴根東引入土五寸者切二升　檳榔十枚碎

右二味以水七升煑取二升半絞去滓著少米煑稀粥平旦空肚
食之少間蟲並死快利效無忌出第四卷中

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方

取龍膽根多少任用以水煑濃汁去滓宿不食平旦
服一二升不過再服下蛔蟲也

又方

取有子楝木根剉以水煑取濃赤黑汁用米煑作糜
宿勿食旦取肥香脯一斤先喫令蟲聞香舉頭稍從
一口為度始少進自後食一匕食半升糜便下蛔秘

靜嘉堂文庫所藏

不傳千金文仲同

又方

以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之蟲悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔蟲攻心腹痛方

取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出千金范汪同出第九卷中

千金療蟯蟲方

雚蘆下篩以餅臛和服方寸匕蟲不覺出之亦主蟯蟲出第十八卷中肘後云雚蘆一兩末以羊肉作臛和服

崔氏療蟯蟲方

取繰蠶蛹汁空腹飲之良若非繰絲時即須收蛹暴乾患者擣篩取意斟酌多少和粥飲服之

又方

波斯鶴蝨三兩

右一味擣散以肥猪羊肉但得一色以葱豉爲臛汁每旦空服以臛汁和一方寸匕頓服稍多飲臛汁佳若不能散服即以蜜和爲丸如梧子一服十丸還以此臛汁下之候令明旦服今日未欲即勿食明旦服藥訖還至巳時爲佳要服此丸散使盡巳後三十日勿雜食永差出第五卷中

必效療蛔蟲方

菉豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以下然後取彊羊升和豆汁一升更煖令温温正發即多羊肉脯令熟先含臑汁三五臑即服之須臾即吐出或利其蟲巳消如帛練帶三二百條如未盡更服即永絕郭參軍云頻試無不差者一方服麻子汁効出第六卷中

寸白蟲方一十九首

靜嘉堂文庫所藏

病源寸白者亦九蟲之一也長一寸而色白形小褊因藏腑虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之幷生栗所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疼弱又云此蟲生長一尺則殺人出第十八卷中

廣濟療白蟲如馬藺葉大於下部出不盡以刀截斷者令人漸漸羸瘦石榴湯方

醋石榴根（東引者一大握） 蕪荑（三兩） 牽牛子（半兩熬末）

右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每服如人行五里更服盡快利蟲亦盡死出忌生冷猪魚牛肉白酒葵筍等此方神驗

又方

狼牙 白斂（各四分） 蕪荑（六分）

右三味擣散空肚以大醋和如膏溫頓服之亦不利無所忌千金同並出第四卷中

肘後療白蟲方

淳漆（三合） 猪血（三合）

右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先喫肥香脯一片服如大豆許一百九日中蟲悉出亦主蚘蟲范汪同

又方

濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡出文仲備急同

又方

熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之蟲當下文仲備急同出第二卷中

范汪療白蟲橘皮丸方

橘皮（四分） 牙子 蕪荑（各六分）

右三味擣篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食日再服

又方

狼牙（五兩）

右一味擣篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿水下一合

靜嘉堂文庫所藏

服盡差

又方　橘實破其上取皮中子擣合蜜丸如梧子宿不食旦以醋漿水若米汁下三百丸然食蟲並死下或以糜爛皮亦可丸服八十九忌如常法出第十九卷中

備急療白蟲蕪荑散方

狼牙三分炙　蕪荑二分

右二味擣爲末酒和服之先食脯後頓服盡立差張文仲同出第六卷中

救急療白蟲方

石榴枝東引者一握去蒼皮　檳榔七枚碎

右二味以水二大升煑取強半頓服欲服時先嚼鹿脯嚥汁即進之法月一二三日喫藥必差以蟲頭向上月三以後服藥不効爲其蟲頭向下也今日欲服預前一日莫食其蟲喫藥之後或利

出或內消皆差忌食生鱠白酒諸生肉冷物一月餘日

又方　取榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不能者但啖五十枚亦得經宿蟲消自下無忌崔氏同出第八卷中

崔氏療白蟲諸方不差方

取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿握一握兩頭出者摠留之又取乾脯肥者如手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煑取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後飲藥并令人以手按所患人腹令藥易宣都服了有頃當日便蟲出服藥以月一至五日以前是蟲頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈

又方　東引茱萸根一大握切　麻子半大升

右二味先擣麻子極碎又盆中熟研以水一大升更和研絞取濃

靜嘉堂文庫所藏

汁以浸茱萸根一宿明旦煑兩三沸頓服如不頓服分再服至
如明旦欲服藥今日午後便不得食仍須先嚼一片肥乾脯嚥
汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後一月
日勿食脂膩魚肉必効不用脯餘同出第五卷中

千金療白蟲方

取榧子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日
服盡蟲消成水永差

又方

取茱萸北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓
分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若指以上
大者皆不佳用之無力范汪同

又方

熬錫令速爆末平旦作羊肉臛以藥方寸匕內汁中
服之一方熬胡粉

又方

桑白皮切三升以水七升煑取二升宿不食明旦頓服之

又方　用石榴根如茱萸根法

又方　胡麻一升　胡粉一兩

右二味擣末明旦空腹以猪肉臛汁服盡即差並出第十八卷中

蟯蟲方六首

病源蟯蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因腑藏虛弱
而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癩癰疽瘑諸瘡蟯蟲此是
人體虛極重者故蟯蟲因之動作無所不爲也出第十八卷中

范汪療蟯蟲芫花散方

芫花　狼牙　雷丸　桃人去尖皮熬各三分

右四味擣散宿勿食平旦以飲服方寸匕當下蟲也

又巴豆白膏療蟯蟲方

巴豆一枚燒令煙斷去心皮　桃人四枚熬令黑去皮

右二味合擣作三丸大人清旦未食以漿水服盡少小服一丸若

靜嘉堂文庫所藏

不下明旦更復作服並出第十九卷中

千金療蟯蟲在胃中漸漸羸人方

淳酒　白蜜　好漆各一升

右三味合銅器中微火上煎之令可丸丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下蟲不下再服之肘後備急集驗范汪同出第十八卷中

備急葛氏療蟯蟲攻心如刺吐清汁方

擣生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令蟲聞香後飲汁一升當下蟯蟲備急文仲並同肘後云療蚘蟲

陶氏療之方

取七月七日蒺藜子陰乾燒作灰先食服方寸匕一服三日止范汪千金同

又方

以好鹽末二兩淳酒半升於銅器中煮令數沸宿勿食清旦沸空肚頓服之備急文仲千金范汪等同

並出第七卷中

三蟲方七首

病源三蟲者長蟲赤蟲蟯蟲為三蟲也猶是九蟲之數也長蟲者蚘蟲也長一尺動則吐清水出則心痛貫心則死赤蟲狀如生因動則腸鳴蟯蟲細微形如菜蟲也居胴腸之間多則為痔劇則為癩因人瘡處即生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不為此既是九蟲內之三者而今別立名者當以其三種偏發動成病故謂三蟲也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩手著頭相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中痛低頭入兩膝閒兩手交叉頭上十二通愈三蟲又云叩齒二七過輒咽氣二七如是三百通乃止為之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去面體光澤出第十八卷中

靜嘉堂文庫所藏

肘後療三蟲方

茱萸根（取東引指大者長一尺）　栝樓（四兩切）

右二味細剉茱萸根以酒一升漬之一宿旦絞去滓宿勿食旦空腹先喫脯然後頓服之小兒分再三服亦療寸白蟲

又方

擣桃葉絞取汁飲一升千金集驗同（一方云平旦飲三合）

又方

眞珠（一兩研）　亂髮（如雞子大燒末）

右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡集驗范汪同（千金治蟯蟲）

又三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃中無不有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白歛丸方

白歛　狼牙　藋蘆　桃花

貫衆（各三分）　橘皮（二分）　蕪荑（一分）

右七味擣篩蜜丸如小豆大宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥下赤蟲如笋莖大者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江謝丘病脅下有積大如杯少腹亦堅伏痛上下移嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤身有口尾二百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿常欲食生菜服此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立差妊身婦人不得服之

又療三蟲竹節丸方

燒竹節　雷丸（各三分）　錫屑（二分）　橘皮（一分半）

右四味擣下篩蜜丸如梧子大一服八丸日三服三日斷口也

又療三蟲葶藶散方

靜嘉堂文庫所藏

芎藭　雷丸　桔梗　白芷各四分

右四味擣散以蜜飲若酒或米汁服方寸匕日三服又可用蜜丸如梧子吞十三丸當稍稍下不見盡服劑出第十九卷中

備急療三蟲方

藋蘆四兩炙　乾漆二兩熬　呉茱萸四兩

右三味爲末依前先嚼脯以粥清服方寸匕日一服祕要法肘後范汪同

雜療蟲方三首

廣濟療蛔蟲寸白蟲方

檳榔人十二分　當歸　鶴虱　蕪荑熬

橘皮各六分　貫衆　雷丸各四分

右七味擣散空腹煑大棗湯服方寸匕日二服漸加至三匕微利無忌出第四卷中

千金療蟯蟲蛔蟲及痔䘌蟲食下部生瘡桃湯方

桃皮一兩　槐子三兩　艾葉一兩　大棗三十枚擘

右四味以水三升煑取半升空腹頓服之出第十八卷中

又療寸白蟲爲水瀉出永除方

榧子　檳榔　蕪荑等分

右三味爲散温酒服二錢匕先燒牛肉脯喫後服藥也

外臺秘要方卷第二十六

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

靜嘉堂文庫所藏